





この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

うちみ・ねんざ・筋肉痛に

新ノイガンハップワール 冷たい貼りごこち

特徴 新ノイガンハップワールは、生薬を配合した冷たい貼りごこの消炎・鎮痛ハップ剤です。消炎・鎮痛成分と3種の生薬（オウバク、サンシシ、サンショウ）エキスが、はれ、熱感などの急性炎症を伴う、うちみ、ねんざ、筋肉痛などに効果を発揮します。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口

☒ 相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起したことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 打撲、捻挫、筋肉痛、筋肉疲労、骨折痛、関節痛、腰痛、肩こり、しもやけ

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付してください。

製造番号

使用期限



4 968250 847126

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、本剤と同じ所に続けて使用しないでください。
(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確認してから使用してください。)

【成分・分量】 青体 100g (1,000㎠)
サリチル酸グリコール···2.0g β-メントール···1.0g

d-カンフル···0.5g トコフェロール酢酸エステル···0.3g

グリチルリチン酸···0.03g

オウバク軟エキス···0.7g (原生薬として2.31g)

サンシシ軟エキス···0.33g (原生薬として1.0g)

サンショウ軟エキス···0.3g (原生薬として1.0g)

添加物として、ゼラチン、カルメロースNa、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸Na、ボリソルベート80、尿素、エデト酸Na、カオリソ、pH調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんとしめて外気にふれないようにしてください。

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 5枚入 (1枚: 14cm × 10cm, 14g)

【販売名】 新ノイガンハップワール

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

鷹屋製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)

【販売元】 鷹屋製薬株式会社 ☎ 0120-149-931

第3類医薬品

鷹屋製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松667番地

