

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

体力が虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれない方の
痔・生理痛などに

漢方薬

第2類医薬品

フジパイゾールK錠

製品の特徴

当帰建中湯は、漢方の原典と言われる「きんぎょりやく金匱要略」に記載されている漢方処方方で、体力が虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれない方の、痔や生理痛などに用いられます。

フジパイゾールK錠は、当帰建中湯をエキス化し、服用しやすい錠剤にした製品です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

むくみ

(7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位（下腹部痛、痔、脱肛の痛みに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症：

月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、脱肛の痛み、病後・術後の体力低下

用法・用量

1回下記量を食前又は食間に水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	6錠	3回
7才以上15才未満	4錠	
5才以上7才未満	3錠	
5才未満	服用させないでください	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用してください。

<用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量（18錠中）

当帰建中湯乾燥エキス 3,776mg

〔トウキ..... 4g ケイヒ..... 4g ショウキョウ..... 1g〕
〔タイソウ..... 4g シャクヤク..... 5g カンゾウ..... 2g〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時（土、日、祝日を除く）

販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
http://www.wakunaga.co.jp/

製造販売元

国産薬品工業株式会社

岐阜市秋沢370番2