

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

たん・たんのからむせきに

# セキセチン去たん カプセル

## 製品の特徴

セキセチン去たんカプセルは、気道粘膜を正常化し、たんを排出しやすくするL-カルボシスティンとたんをうすめて排出しやすくするプロムヘキシン塩酸塩が配合されており、「たんのからむせき」に効果をあらわします。8才のお子様から服用できます。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
1. 次の人は服用しないでください。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 次の症状のある人 高熱
  - (5) 次の診断を受けた人 肝臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーガンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

たん、たんのからむせき

## 用法・用量

1回下記量を食後に水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	2カプセル	3回
8才以上15才未満	1カプセル	
8才未満	服用させないでください	

本剤の服用により、一時的にたんの量が増加することがあります。

### <用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分とはたらき

成 分	分 量 (6カプセル中)	は た ら き
L-カルボシスティン	750mg	気道粘液の粘度を正常化するとともに線毛のはたらきを改善し、たんを排出しやすくなります。
プロムヘキシン塩酸塩	12mg	気道粘膜の分泌を促進させて、のどにからむたんをうすめ、排出しやすくなります。

添加物として、トウモロコシデンプン、ケイ酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有します。カプセル本体にゼラチン、ラウリル硫酸Naを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### ●ワンポイント情報

#### たんは、もともと気道や肺を守る分泌物

気道粘膜は粘液で覆われており、粘液は細菌やウイルスなどの異物をからめとり、たんとなり体の外へ排出する役割を担っています。健康な人では粘液はごく少量であるため、無意識のうちに飲み込んでいることもあります。

しかし、気道粘膜が異物の刺激を受けたり炎症をおこすことにより粘液の量が増えたり、粘り気が強くなり排出が困難になることがあります。たんのからんだせきが長く続くと、せきにより傷ついた粘膜がさらに炎症をおこし、せきが続けて出るという悪循環になります。

早めに手当てをすることが大切です。



## お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時（土、日、祝日を除く）

販売元

湧永製薬株式会社  
広島県安芸高田市甲田町下甲立1624  
<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

滋賀県製薬株式会社  
滋賀県甲賀市甲賀町滝879