

レック H 軟膏
使用上の注意改訂のお知らせ

平成 29 年 10 月 17 日付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課 課長通知にて、一般用医薬品のクロルヘキシジングルコン酸塩又はクロルヘキシジン塩酸塩含有製剤の「使用上の注意」改訂の指示が発出されました。

それに伴い、本品の使用上の注意につきまして、下記のとおり改訂いたします。
 つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い申し上げます。

記

<改訂内容>

改訂前	改訂後（____：改訂箇所）																
<p>「してはいけないこと」</p> <p>（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）</p> <p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>「相談すること」</p> <p>1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>（中略）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">関係部位</th> <th style="text-align: center;">症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">皮 膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ、はれ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他</td> <td>刺激感</td> </tr> </tbody> </table> <p>（以下省略）</p>	関係部位	症 状	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ	その他	刺激感	<p>「してはいけないこと」</p> <p>（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）</p> <p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>（1）本剤又は本剤の成分、<u>クロルヘキシジン</u>によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>「相談すること」</p> <p>1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>（中略）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">関係部位</th> <th style="text-align: center;">症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">皮 膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ、はれ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他</td> <td>刺激感</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">症状の名称</th> <th style="text-align: center;">症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><u>ショック</u> <u>（アナフィラキシー）</u></td> <td><u>使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>（以下省略）</p>	関係部位	症 状	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ	その他	刺激感	症状の名称	症 状	<u>ショック</u> <u>（アナフィラキシー）</u>	<u>使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</u>
関係部位	症 状																
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ																
その他	刺激感																
関係部位	症 状																
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ																
その他	刺激感																
症状の名称	症 状																
<u>ショック</u> <u>（アナフィラキシー）</u>	<u>使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</u>																