

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

痔疾治療薬

レックス注入軟膏

第②類医薬品

製品の特徴

レックス注入軟膏は6種類の有効成分により、痔に伴う痛み・出血・はれ・かゆみなどの症状にすぐれた効果を発揮します。

注入・塗布の2通りの使用方法が選べます。1個ずつアルミ袋で包装されているため携帯可能で、外出先での急な症状にも対応できます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)患部が化膿している人

2. 長期運用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和

用法・用量

【注入する場合】

ノズル部分を肛門内に挿入し、全量を注入してください。


年齢	1回量	1日使用回数
大人(15才以上)	1個	1～2回
15才未満	使用させないでください。	



【塗布する場合】

次の量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

年齢	1回量	1日使用回数
大人(15才以上)	適量	1～2回
15才未満	使用させないでください。	



※注入式のため、容器の中に薬剤が少量残りますが、残量を見込んで充填しています。

※軟膏が硬くて出しにくい場合は、手の中で温めると出しやすくなります。

<用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)肛門部のみ使用してください。
- (3)肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入してください。

成分とはたらき

成分	分量(1個(2g)中)	はたらき
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg	患部の炎症をしずめます。
リドカイン	60mg	患部の痛み・かゆみをしずめます。
酸化亜鉛	100mg	患部の炎症をおさえ、保護します。
アラントイン	20mg	傷口の治りを早め、痔の症状をしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	50mg	末梢の血行をよくし、患部のはれ・痛みなどの症状をしずめます。
Q-メントール	10mg	患部に清涼感を与え、かゆみをしずめます。

添加物として、サラシミツロウ、流動パラフィン、スクワラン、オリーブ油、ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は期限内であってもなるべく早く使用してください。
- (5)使用済みの容器等はトイレに流さないでください。

販売元

湧永製薬株式会社
広島県安芸高田市甲田町下甲1624
http://www.wakunaga.co.jp/

製造販売元

株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室 ☎0570-666-170
受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)