

## ワクナガフジコール IP錠使用上の注意改訂のお知らせ

令和6年10月08日付 厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知にて、一般用医薬品のイブプロフェン含有製剤の「使用上の注意」改訂の指示が発出されました。それに伴い、本品の「使用上の注意」につきまして、下記のとおり改訂いたします。つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い申し上げます。

## 記

## &lt;改訂内容&gt;

改訂前	改訂後（____：改訂箇所）																								
<p><b>[添付文書に記載すべき事項]</b></p> <p><b>相談すること</b></p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td>略</td> </tr> <tr> <td>無菌性髄膜炎</td> <td>首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐などがあらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。</td> </tr> <tr> <td>間質性肺炎</td> <td>階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td>略</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. (略)</p>	症状の名称	症状	略	略	無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐などがあらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。	略	略	<p><b>[添付文書に記載すべき事項]</b></p> <p><b>相談すること</b></p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td>略</td> </tr> <tr> <td>無菌性髄膜炎</td> <td>首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐などがあらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。</td> </tr> <tr> <td><u>心筋梗塞</u></td> <td><u>しめつけられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。</u></td> </tr> <tr> <td><u>脳血管障害</u></td> <td><u>意識の低下・消失、片側の手足が動かしくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。</u></td> </tr> <tr> <td>間質性肺炎</td> <td>階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td>略</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. (略)</p>	症状の名称	症状	略	略	無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐などがあらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。	<u>心筋梗塞</u>	<u>しめつけられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。</u>	<u>脳血管障害</u>	<u>意識の低下・消失、片側の手足が動かしくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。</u>	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。	略	略
症状の名称	症状																								
略	略																								
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐などがあらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。																								
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。																								
略	略																								
症状の名称	症状																								
略	略																								
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐などがあらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。																								
<u>心筋梗塞</u>	<u>しめつけられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。</u>																								
<u>脳血管障害</u>	<u>意識の低下・消失、片側の手足が動かしくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。</u>																								
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。																								
略	略																								